

Чтобы стимулировать родовую деятельность в настоящее время применяют окситоцин, амниотомию и простагландины. Классические методики Штейна и другие уже практически не используются. На февраль 2011 года перечисленные [лекарственные средства](#) вводят не только внутривенно, но и трансбукально. Для введения окситоцина внутривенно ставят капельницу, содержащую согласно инструкции концентрацию лекарственного препарата.

Скорость введения около 8-10 капель в минуту. Если должной стимуляции родовой деятельности не наблюдается через 15 минут, то скорость вливания увеличивают до 5 капель по одной минуте. Так делают до наличия эффекта, однако не больше 40 в минуту. Если спустя 2-3 часа результат не получен, то прибегают к более эффективному методу, а именно [ведение вещества через инфузомат](#). Если стимуляция сокращений матки прослеживается, то введение окситоцина не прекращают, так как в большинстве случаев наблюдается обратное развитие обратного эффекта спустя 10 минут.

Что касается таблетированных форм, то их использование в настоящее время ограничено из-за невозможности грамотного дозирования. Их можно применять только в малых дозах. Если будет передозировка – возможна гиперстимуляция маточной активности с соответствующими последствиями. Что касается простагландинов, то они используются с 1970 года и по наши дни. Их применение по скорости начинают с 10 капель в минуту и поднимают максимум до 40, в зависимости от [сократительной активности матки](#). Их эффект реализуется через 10-20 минут. При стимуляции родовой деятельности следует регулярно осматривать характер маточных сокращений и ширину раскрытия маточного зева. Так как чрезмерные сокращения мускулатуры приводит к пережатию сосудов плаценты и гипоксии плода, что чревато врожденными травмами и летальным исходом. Следует напомнить, что по современным стандартам на 2011 год введение анальгетических и спазмолитических препаратов является обязательным. Однако опиатные препараты оказывают угнетающее действие на дыхание будущего ребенка.

[Лекарственные свойства меда](#) при лечении различных заболеваний

Прочитать еще:

- 1) [Инфаркт в почках и селезенке](#)

- 2) [Этиология врожденных пороков](#)

- 3) [Течение атеросклероза](#)