

При роговой дистрофии, или патологическом ороговении, наблюдается избыточное образование рогового вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ихтиоз) или же роговое вещество образуется там, где в норме ороговение не встречается.

Так, патологическое ороговение может появляться на слизистых оболочках (лейкоплакия), в эпителиальных опухолях (например, образование «раковых жемчужин» в плоскоклеточном раке). Процесс может быть местным или распространенным («**врожденный ихтиоз**»).

Причины роговой дистрофии разнообразны: неправильное развитие кожи, [хроническое воспаление](#),

вирусная инфекция, авитаминоз и т. д.

Исход роговой дистрофии может быть двояким. Устранение вызывающей ее причины нередко приводит к восстановлению ткани, однако в далеко зашедших случаях наступает гибель клеток. Значение роговой дистрофии определяется распространенностью, степенью и **длительностью процесса**. Длительно существующий местный очаг патологического ороговения слизистой оболочки (лейкоплакия, лейкокератоз) может явиться источником развития раковой опухоли. Врожденный ихтиоз резкой степени, как правило, несовместим с жизнью. Внешние признаки роговой дистрофии практически не заметны. Обращают на себя плотные ткани и немного их блестящий оттенок.

Прочитать еще:

Written by Super Administrator

1) Иммунологические ответы

2) Дифтеритическое воспаление

3) Обратное развитие фиброза