

Воспалительные разрастания эпителия, например по краю длительно не заживающих ран или язв, иногда достигают значительной степени, и бывает трудно дифференцировать их от раковых разрастаний, которые могут возникать в краях язв, не заживающих в течение 5—7 лет.

Воспалительные разрастания паренхиматозных элементов иногда наблюдаются во всех органах и тканях. Так, в лимфоидных органах (лимфатические узлы, селезенка, тимус, солитарные фолликулы) при воспалении происходит **размножение** лимфоцитов и даже образуются новые фолликулы. Лимфоидные органы увеличиваются в размерах, становятся плотными.

Иногда трудно провести границу между воспалением и [гиперпластическим процессом](#). Такие лимфоидные разрастания возникают в носоглотке и ведут к образованию **аденоидных полипов**, причем одни исследователи относят их к проявлениям воспаления, а другие — к гиперплазии. В печени при воспалении желчных протоков возникают разрастания эпителия с образованием новых желчных путей. В нервной системе пролиферируют элементы неvroглии (главным образом микроглия), из которых могут формироваться подвижные клеточные формы, способные к фагоцитозу.

Явления **пролиферации** при воспалении способствуют отграничению воспалительного очага и могут в ряде случаев рассматриваться как морфологические признаки затихания воспалительного процесса. В других случаях пролиферация принимает прогрессирующий характер и свидетельствует о переходе воспаления в хроническую форму.

Прочитать еще:

1) [Патология языко-глоточного нерва](#)

2) [Особые формы гиперкинезов](#)

3) [Пиломоторные рефлексy](#)