При саркоидозе (**болезнь Бенье — Бека — Шаумана**), заболевании неизвестной этиологии, в лимфатических узлах и, реже, во внутренних органах образуются гранулемы из эпителиоидных и гигантских многоядерных клеток с небольшой примесью лимфоцитов (саркоидиые гранулемы).

Признаков некроза в гранулемах обычно не видно и этим они отличаются от туберкулезных узелков, хотя имеют очень сходное с ними строение. Гранулемы обладают наклонностью к гиалинозу. Некоторые авторы относят саркоидоз к группе ретикулозов.

Образование в организме гранулем, характеризующихся, как было указано выше, клеточными пролиферациями, имеет отношение к иммунологическим процессам в организме. Гранулематоз определенным образом отражает динамику **иммунологического процесса** — от начальных стадий повреждения ткани до его конечных фаз, заканчивающихся рубцеванием гранулемы, что; указывает на высокую степень резистентности организма. Следует также добавить лимфогранулематоз любой этиологии сопровождается появлением, плазматических клеток, участвующих в иммунологических процессах. Что касается лечения саркоидоза, медикаментозная терапия должного эффекта не дает. Помогает только комплексное лечение с применением облучения и радиоактивных препаратов.

Прочитать еще:

1) Опухоли экзокринных желез

2) Злокачественные опухоли щитовидной железы

3) Опухоли сосудистого происхождения