

Известно, что воспаление может иметь весьма разнообразную этиологию, в связи с чем все его виды можно разделить не только по морфологическому, но и по этиологическому принципу.

Виды воспаления по морфологическому принципу были подробно описаны. По этиологическому принципу выделяют воспаления обычные, или банальные, и специфические.

Банальное воспаление вызывается **самыми разнообразными факторами**, имеет циклическое течение, сопровождается явлениями альтерации, экссудации, пролиферации. По морфологической картине не представляется возможным судить об этиологии воспаления. Огромное большинство случаев заканчивается полной ликвидацией

[воспалительных процессов](#)

и восстановлением структур пораженного органа. Только тогда, когда банальное воспаление приобретает распространенный или хронический характер, оно может привести к деформации органа и значительным функциональным нарушениям.

Совершенно иная картина

развивается при специфическом воспалении, которое вызывается туберкулезной микобактерией, бледной спирохетой, палочками лепры и сапа и бациллой

Волковича — Фриша

. Каждый из этих микробов вызывает довольно характерные тканевые реактивные изменения и по морфологической картине можно с известной долей вероятности судить об этиологии воспаления. Вот почему этот вид воспаления и носит название специфического, т. е. свойственного только данному возбудителю.

Прочитать еще:

- 1) [Осложнения](#) при гипертонической болезни
- 2) [Иммунитет при ревматизме](#)
- 3) [Данные исследований](#) (артериальная гипертензия)