

Морфологически специфическое воспаление проявляется всеми теми же признаками, которые характеризуют воспаление вообще, т. е. явлениями альтерации, экссудации и пролиферации.

Однако по ходу специфического воспаления возникают дополнительные процессы, придающие ему специфику. Специфическое воспаление — это понятие не только морфологическое, но и клинико-морфологическое. О его наличии судят по совокупности клинических и морфологических проявлений, которые могут быть сведены к следующим признакам.

1. Каждое специфическое воспаление имеет собственного возбудителя.
2. По ходу специфического воспаления идет переход тканевых реакций, что характеризуется иммунологической защитой человека.
3. Специфическое воспаление имеет затяжное скачкообразное течение, при котором эпизоды ремиссии процесса сменяются этапами обострения.
4. При специфическом воспалении превалирует продуктивная тканевая реакция и идет процесс созревания гранулемы — наиболее типичного морфологического критерия специфичности. В течение прогрессирования специфического воспаления закономерно диагностируют некроз экссудата, пролиферата и предшествующей ткани, **при чем различают:**

а) первичный некроз, возникающий при преобладании альтеративной тканевой реакции и без предшествующего образования гранулемы;

б) вторичный некроз, возникающий при преобладании экссудативной или продуктивной тканевой реакции.

Все эти признаки специфического воспаления, хотя они и складываются из тех же элементов, что и банальное воспаление, все же придают первому особые черты, среди которых особое значение имеют развитие гранулемы, хроническое течение и образование некроза. Эти признаки как бы объединяют все виды специфического воспаления, но в то же время они отличаются друг от друга, что будет показано при их описании.



Прочитать еще:

- 1) [Отек легких и его микроскопическая картина](#)

- 2) [Липосклероз и Атероматоз](#)

- 3) [Стадии гипертонии](#)