

Нередко вокруг некротических бугорков возникает экссудативное перифокальное воспаление, обычно серозного характера, которое рассасывается по мере затихания процесса и замещается продуктивной тканевой реакцией.

Таким образом, при воспалении, вызванном туберкулезной микобактерией, могут наблюдаться в зависимости от реактивности организма три вида **тканевых реакций** — альтеративная, экссудативная и продуктивная. Специфичность

воспаления

отчетливо выявляется при продуктивной тканевой реакции и оказывается стертой при альтеративной и экссудативной. В таких случаях только окраска срезов на микобактерии позволяет выяснить этиологию воспаления.

Воспаление

, вызываемое туберкулезной микобактерией, отличается большим разнообразием.

В наиболее типичном виде оно характеризуется образованием просовидных бугорков разного типа строения. Однако, помимо бугорков, возникают и более крупные очаги, или туберкулы, туберкуломы, достигающие размера горошины и даже грецкого ореха. Очаги туберкулезного воспаления в легком могут ограничиваться ацинусом, долькой, сегментом и занимать даже всю долю. В связи с этим различают экссудативные (пневм
онические

)

очаги

: ацинозные, лобулярные, сегментарные и долевы. При преобладании продуктивной тканевой реакции возникают очаги: ацинозные, нодозные, инкапсулированные, т.е. тарифицированные и даже окостеневшие.

Творожистые очаги представляют собой очаги сухого некроза, но они могут расплавляться и тогда на их месте, где бы они не возникали, появляются полости распада, или каверны, на слизистых оболочках, например кишечника, и на коже — язвы. Туберкулезное воспаление может прогрессировать и в этих случаях отмечаются экссудативная тканевая реакция, перифокальное воспаление, обширные очаги некроза, образование язв и каверн. При затихании воспаления экссудативная реакция сменяется продуктивной, перифокальное воспаление затихает, очаги некроза дегидрируются и пропитываются известью.



Прочитать еще:

1) [Роговая дистрофия](#)

2) [Виды амилоидоза](#)

3) [Гематоидин](#)