

Голодание может развиваться в тех случаях, когда человек в силу тех или иных причин не принимает пищу. Но может наблюдаться вынужденное голодание, вызванное, например, раковой опухолью в пищеводе или желудке.

Пища не попадает в достаточном количестве в организм, не переваривается в желудке и постепенно развивается [голодание](#), которое приводит к раковой кахексии. Она может наблюдаться и при раке другой локализации, но выражена не в такой сильной степени, как при раке органов пищеварения. Известны случаи развития тяжелых форм истощения на почве поражения межуточного мозга, когда резко нарушается усвоение питательных веществ (церебральная кахексия). По той же причине возникает истощение при наличии рубцовых изменений в передней доле гипофиза, что обозначается как гипофизарная кахексия, или болезнь **Симмондса**. Атрофии гормонального происхождения возникают при понижении функции щитовидной железы (**микседема**).

Кахексия развивается и при некоторых хронических инфекциях (туберкулез).

Местная атрофия возникает от разнообразных причин. В зависимости от их характера различают следующие виды местной атрофии: нейротическая; дисфункциональная; от недостаточности кровоснабжения; от давления на орган извне; от воздействия физических и химических факторов.

Прочитать еще:

- 1) [Морфология гиперергического воспаления](#)
- 2) [Гистохимические анализы](#)
- 3) [Организация миокарда и иммунитета](#)