

Поздний рахит возникает у детей в возрасте 4 — 6 лет. При этом заболевании преобладают нарушения не энхондрального, а эндостального костеобразования. Эндостальное образование остеоидной ткани приводит к наслоению ее на старые костные балки.

Кости, особенно нижних конечностей, подвергаются [деформации](#). Изменяется форма грудной клетки, позвоночника, черепа.

Остеомаляция — проявление D-авитаминоза у взрослых. Обычно наблюдается при нарушении всасывания витамина D из кишечника (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), у стариков, при усиленной потребности в этом витамине (например, при беременности), гипертиреозе, ренальном ацидозе, когда нормальный пищевой рацион витамина D ее не покрывает. Изменения костей проявляются отсутствием обызвествления новых костных структур, возникающих в процессе перестройки. Образуется остеоидная ткань, которая не может обеспечить нормальную опорную функцию костной ткани. При рахите, особенно раннем и позднем, наблюдается анемия, увеличение селезенки и лимфатических узлов, вздутие живота вследствие атонии мышц.

Смертельных исходов при рахите не наблюдается. Однако у маленьких детей на почве рахита, особенно при наличии деформации грудной клетки, легко возникают пневмонии, расстройства питания, гнойные инфекции, которые могут привести к смерти ребенка.

Поздний рахит

Written by Super Administrator

Friday, 26 November 2010 19:16 - Last Updated Wednesday, 11 July 2012 17:51

Прочитать еще:

- 1) [Редкие локализации тромбов](#)
- 2) [Виды желтух](#)
- 3) [Применение химических реакций при амилоидозе](#)