

Среди хрящевых и костных дисплазий встречаются такие разрастания хрящевой или костной ткани (экхондрозы, экзостозы, остеоэкхондрозы), которые имеют выраженный очаговый характер.

Наблюдаются также множественные экхондрозы и экзостозы. Среди костных дисплазий особенно важное значение имеет фиброзная дисплазия костей. Она может быть **монооссальной**

, т. е. поражает одну кость, и полиоссальной, когда в процесс вовлекается несколько костей. Чаще всего поражаются бедренная и большеберцовая кости. Первоначально кости сохраняют свою конфигурацию, а затем как бы вздуваются, искривляются, легко ломаются. На распилах таких костей отмечается истончение кортикального слоя, костномозговая полость замещена тканью беловато-серого цвета. Встречаются кисты. Гистологическое исследование показывает наличие волокнистой

[соединительной ткани](#)

, замещающей костный мозг. В отдельных ее участках видны костные балки, образующие губчатую кость разной зрелости. Иногда при фиброзной дисплазии наблюдаются внекостные изменения в виде множественных фибромиксом мягких тканей, патологической пигментации кожи (чаще в области бедра и ягодиц), преждевременного полового созревания. Болезнь встречается в детском и юношеском возрасте. Этиология и патогенез ее остаются неясными.

Прочитать еще:

- 1) [Онкологические признаки](#)
- 2) [Отличительные особенности опухолевых клеток](#)
- 3) [Тератомы](#)