

Источником тромбоэмболии большого круга кровообращения являются тромбы, возникающие на створках клапанов сердца при эндокардите, тромбы, расположенные между трабекулярными мышцами желудочков, в аневризме сердца или в ушке левого предсердия, в просвете аорты и других артерий.

Эмболии принимают иногда **множественный характер** и эмболы появляются то в одном, то в другом органе, вызывая значительные сосудистые расстройства со стороны различных органов. В таких случаях в клинике говорят о тромбоэмболическом синдроме. Хирурги разработали методику операции эмболэктомии, т. е. извлечения эмбола из просвета легочной артерии, из аорты, крупных магистральных сосудов конечностей.

При обнаружении во время вскрытия [тромбоэмболии](#) необходимо установить ее **источник**.

Так, при тромбоэмболии легочной артерии тщательно исследуют вены нижних конечностей, малого таза, полые вены. Ввиду того что чаще всего отрывается хвост тромба или хвост с телом, необходимо найти головку тромба. По окружности **эмбола**

можно догадываться и о размерах сосуда, где тромб образовался. Головка тромба иногда выглядит в виде небольшой шероховатости на интиме, а в редких случаях не удается найти следов тромба в крупных венах. В таких случаях необходимо тщательно осмотреть вены голени, для чего делают поперечные разрезы через мышцы голени; на поверхности разреза тромбированные вены обычно хорошо видны.

При эмболиях большого круга необходимо тщательно осматривать сердце, которое чаще всего является источником эмболии.

Прочитать еще:

- 1) [Трупное окоченение](#)
- 2) [Нарушения обмена цитоплазматического жира](#)
- 3) [Воспалительные разрастания эпителия](#)