

Нежелательные лекарственные реакции основных классов лечения гипертензии.

Важным аспектом в формировании высокой приверженности пациента к назначенному лечению является доступное информирование врачом больного о возможности появления [нежелательных явлений](#) принимаемых лекарственных препаратов.

Нежелательные явления (эффе́кты) - любое неблагоприятное изменение в состоянии здоровья пациента, получающего фармацевтический продукт независимо от причинной связи с этим **лечением**:

непреднамеренное появление неблагоприятного объективного или субъективного симптома;

появление аномальных значений лабораторных анализов (как разновидность объективных симптомов);

появление сопутствующего заболевания или утяжеление его течения.

Среди разновидностей нежелательных явлений можно выделить:

серьезные нежелательные явления;

нежелательные лекарственные реакции;

неожиданные нежелательные лекарственные реакции.

Необходимо помнить, что своевременное выявление нежелательных лекарственных реакций АГТ поможет избежать самостоятельной отмены пациентом рекомендованного лечения и предпринять возможные меры по устранению нежелательного эффекта лекарственного вещества в наиболее короткие сроки. Кроме того, **заблаговременное предупреждение**

больного о вероятности развития нежелательного действия назначенного препарата поможет повысить доверие пациента к врачу, как к высококвалифицированному профессионалу и обеспечить высокую мотивацию больного строго рекомендованной АГТ. Высокая приверженность пациента к лечению и прилежное выполнение им врачебных назначений снижают вероятность развития рефрактерной АГ.

Важно отметить, что одним из нежелательных проявлений терапии, значительно снижающим приверженность пациента к лечению является синдром отмены, который характеризуется появлением [выраженной реакции](#), противоположной действию препарата или возникновению новых клинических признаков, в ответ на внезапное прекращение приема лекарственного средства. Наиболее часто синдром отмены наблюдается при применения В - блокаторов, поэтому в случае необходимости в приеме

Нежелательные лекарственные проявления

Written by Super Administrator

Thursday, 23 December 2010 17:25 - Last Updated Thursday, 19 July 2012 10:54

пациентом данного класса АГП, отменять препарат следует постепенно снижая его дозировку.

Необходимо понимать, что АГ является заболеванием, требующим постоянного применения лекарственных препаратов и контроля получаемых результатов в лечении, поэтому высокая приверженность пациента играет важную роль в достижении желаемого результата. Следовательно, для повышения вероятности добросовестного выполнения всех рекомендаций, необходимо совместное участие и сотрудничество в лечении, как врача, так и пациента.



Прочитать еще:

- 1) [Классификация эндокардита](#)

- 2) [Липосклероз и Атероматоз](#)

Нежелательные лекарственные проявления

Written by Super Administrator

Thursday, 23 December 2010 17:25 - Last Updated Thursday, 19 July 2012 10:54

3) [Кистаденокардиома](#)