

В **стенке кишки** инфаркты носят геморрагический характер и обычно возникают при закупорке крупной ветви брыжеечной артерии. Границы инфаркта четко выделяются на фоне здоровых петель кишки. В сетчатке глаза инфаркты белые, но если имеется застой крови, то инфаркт может принять геморрагический характер.

Очень редко встречаются инфаркты в печени, мышцах, костях.

До сих пор описывались инфаркты, вызванные **закупоркой** просвета артерий. Однако бывают и так называемые застойные, венозные инфаркты, возникающие при тромбозе вен. Такие венозные инфаркты, очень похожие на геморрагические, встречаются в легких, почках, селезенке, мозгу, стенке кишки.

Значение инфаркта для организма в значительной мере определяется органом, в котором развивается инфаркт, его размером и характером, а также осложнениями, которые могут возникнуть вслед за развитием инфаркта. Так, особенно опасен инфаркт миокарда, приводящий к резкому [нарушению сердечной деятельности](#), развитию

острой аневризмы

и разрыву ее с тампонадой сердца и смертельным исходом. В результате инфаркта миокарда иногда возникают разрывы межжелудочковой перегородки, отрыв папиллярных мышц, что также ведет к серьезным последствиям. В исходе перикардита развиваются спайки между листками сердечной сорочки. После инфаркта остаются рубцы и возможно образование хронической аневризмы сердца.

Инфаркты в легком не представляют большой опасности, но возникающие вокруг них так называемые инфарктные пневмонии могут оказать неблагоприятное влияние на деятельность сердца. Отягощает течение болезни размягчение геморрагического инфаркта легкого с нагноением и образованием абсцесса; возможен прорыв его содержимого в плевральную полость с развитием плеврита, эмпиемы, пневмоторакса и т. д.

Прочитать еще:

- 1) [Злокачественные опухоли яичников](#)
- 2) [Олигодендроглиома и хориоипапиллома](#)
- 3) [Анемии после кровотечения](#)