

Эндокардит — воспаление эндокарда, т.е. внутренней оболочки сердца, возникает при целом ряде заболеваний и, таким образом, не является самостоятельной нозологической формой.

Этиология эндокардита разнообразна. Так, эндокардит может явиться осложнением целого ряда инфекционных болезней: крупозной пневмонии, скарлатины, тифов, бруцеллеза, гонореи, ангины, остеомиелита, [сепсиса](#), грибковых заболеваний и т. д. Кроме того, эндокардиты возникают на основе инфекционно-аллергических реакций организма, как, например, при ревматизме. Существует абактериальный аллергический эндокардит (см., например, системную красную волчанку), токсический, травматический, терминальный и др.

Патогенез эндокардита тесно связан с инфекционным фактором. Инфекционные эндокардиты возникают, вероятнее всего, в результате непосредственного оседания микробов на эндокард с последующим развитием воспаления. Однако это происходит не в каждом случае инфекционного заболевания, а при наличии повышенной **ре активности организма**

. Во всяком случае экспериментально эндокардит, например у кроликов, значительно легче вызвать при введении микробов животным, предварительно сенсibilизированным лошадиной сывороткой. В клинике также известно, что подавляющее большинство эндокардитов (до 95 %) возникает у больных, страдающих ревматизмом, т.е. болезнью, протекающей с ярко выраженной гиперергической реакцией по отношению к стрептококку и его токсинам. Эндокардит после ангины, скарлатины появляется обычно, когда организм сенсibilизирован стрептококком.



Прочитать еще:

Эндокардит

Written by Super Administrator

Saturday, 16 October 2010 15:22 - Last Updated Wednesday, 25 July 2012 11:41

1) [Прогрессирование кавернозного туберкулеза](#)

2) [Формы сибирской язвы](#)

3) [Балантидиоз](#)