Атеросклероз аорты встречается чаще, чем в других сосудах, и особенно ярко выражен в брюшном ее отделе. Здесь же возникают и все осложнения, связанные с атеросклерозом: аневризмы, их разрывы, тромбозы вплоть до полного закрытия просвета.

Какой бы ни была преимущественная локализация **атеросклеротических изменений** сосудов (коронарные, мозговые, артерии и др.), брюшная аорта всегда бывает поражена и иногда в весьма значительной степени. По этому по состоянию аорты можно весьма достоверно судить о наличии или отсутствии атеросклероза в организме вообще.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), изучая распространение [атеросклероза](#), пользуется данными вскрытий и предложила единую международную номенклатуру для обозначения атеросклеротических изменений аорты.

Атеросклероз легочной артерии наблюдается только в условиях гипертонии малого круга и обычно носит вторичный характер. Атеросклероз вен встречается редко, но если он развивается, возникает картина, в общем сходная с **атеросклерозом артерий**. Атеросклероз вен встречается в воротной вене при повышении давления в портальной системе, как это наблюдается при циррозах печени, сужении воротной вены, ее тромбозе и т. д. В условиях гипертонии малого круга кровообращения, например при митральном пороке, может развиваться атеросклероз легочных вен.

Прочитать еще: