

Малокровие — процесс, противоположный полнокровию; может носить общий и местный характер. **Общее малокровие** возникает при заболеваниях кроветворной системы, когда вырабатывается недостаточное количество эритроцитов или же при нормальной их продукции наблюдается усиленный распад (гемолиз).

Анемия развивается также при потере крови в связи с частыми и повторяющимися кровотечениями, например при язве желудка, туберкулезе легких, некоторых [опухолях](#). Местное малокровие возникает в тех случаях, когда по каким-либо причинам (спазм артерий, сужение или закрытие их просвета, сдавление артерии извне) приток крови к органу уменьшается или совсем прекращается, а отток крови не нарушен. Признаки местного малокровия выражаются побледнением ткани или органа, понижением его температуры, ослаблением тонуса ткани, уменьшением органа в объеме, вследствие чего капсула, покрывающая орган, становится морщинистой.

Причины местного малокровия разнообразны, в связи с чем различают следующие его виды:

- 1) ангиоспастическое;
- 2) обтурационное;
- 3) компрессионное.

В целом малокровие остается серьезной проблемой в медицине, ведь если осложнения этого процесса наступили не сразу, то вполне вероятно проявление их в дальнейшем, даже спустя годы.

Прочитать еще:

- 1) [Вторичные изменения в опухолях](#)
- 2) [Ишемические гастродуоденопатии](#)
- 3) [Злокачественные опухоли костной ткани](#)