

Если закрытие просвета артериального сосуда происходит медленно, то постепенно развивается коллатеральная гиперемия, кровоток частично или полностью восстанавливается, а последствия такой анемии могут быть незначительными или дело ограничивается атрофией и склерозом части органа.

При быстрой закупорке просвета сосуда наступает омертвление соответствующей части органа или конечности. Следует отметить, что для развития коллатералей большое значение имеет состояние сосудистой стенки. На исход местного малокровия оказывает влияние и калибр пораженного сосуда, а также **ангиоархитектоника органа**, которая может иметь свои специфические особенности в связи со своеобразием его функции и строения. В настоящее время установлено, что в таких жизненно важных органах, как сердце, почки, легкие, имеется развитая и разнообразная система коллатералей, но их [функциональная достаточность](#) оказывается неоднозначной в зависимости от общего состояния кровообращения. В связи с этим последствия местного малокровия могут быть в значительной мере обусловлены деятельностью сердца, т. е. тем, имеются ли признаки расстройства его деятельности или нет.

В первом случае при наличии-явлении застойного полнокровия, склероза сосудов эти последствия могут быть более тяжелыми и опасными, при хорошей деятельности сердца — более **благоприятными**.

Прочитать еще:

- 1) [Неблагоприятные исходы](#)
- 2) [Редкие изменения](#) при гипертонии
- 3) [Диагностика причины, вызвавшей артериальную гипертензию](#)