

Иногда в капиллярах, артериолах и венулах образование т.ромба огра-вается только явлениями агглютинации эритроцитов и тромбоцитов, или же тромбы образуются в результате выпадения (преципитации) белков плазмы.

В таких случаях тромботические массы сливаются в **однородную гиалиноподобную массу** . Такие тромбы называются

гиалиновыми и встречаются как осложнение стойкого стаза при некоторых интоксикациях, при ожогах, переливании несовместимой крови. В зависимости от некоторых особенностей клинического проявления выделяют так называемые мигрирующие тромбы, т.е. возникающие в

разных отделах организма

у лиц с особой предрасположенностью к свертыванию крови. Тромбы, появляющиеся вследствие ослабления деятельности сердца, называют застойными, или

[марантическими, тромбы](#)

, образующиеся в аневризмах, — дилатационными. Если образование тромба сочетается с

воспалением

вен или артерий, говорят о тромбофлебите или тромбартериите. Воспаление клапанного и пристеночного эндокарда сердца носит название тромбоэндокардита.

Тромбы стенки левого предсердия, возникающие при митральном пороке сердца, могут отрываться от стенки и свободно находиться в полости предсердия. Движениями крови они как бы отшлифовываются, принимают круглую форму и носят название шаровидных тромбов.

Исходы тромбоза

Written by Super Administrator

Tuesday, 09 November 2010 14:23 - Last Updated Wednesday, 25 July 2012 08:29

Прочитать еще:

1) [Современные концепции воспаления](#)

2) [Секвестр и его исход](#)

3) [Общий гемосидероз](#)