

Из осложнений острой почечной недостаточности самым тяжелым является сегментарный или тотальный некроз коркового вещества почек.

В возникновении его решающую роль играют длительность почечной ишемии и глубина циркуляторных нарушений. Вероятно участие в развитии кортикального некроза и аллергических механизмов. Об этом свидетельствуют [морфологические проявления](#) гиперергической реакции в почках при кортикальном некрозе (фибриноидный некроз артериол и капилляров клубочков, тромбоваскулиты) и воспроизведение в эксперименте подобных изменений с помощью

феномена Шварцмана

. Исходом некротического нефроза может быть выздоровление без перехода в **хроническое заболевание почек**

. Причиной смерти при некронефрозе является острая уремия, причем смерть наступает чаще либо в шоковой, либо в конце олигоанурической стадии. Кортикальный некроз почек в подавляющем большинстве случаев ведет к летальному исходу, несмотря на значительное пролонгирование заболевания благодаря применению гемодиализа.

Гемодиализ, осуществляемый с помощью аппаратов искусственной почки, в последние годы широко вошел в практику лечения острой **почечной недостаточности**. С помощью гемодиализа удастся заменить на время глубоко нарушенные функции почек — удалить из организма азотистые шлаки, экзогенные и эндогенные яды, выровнять водно-электролитный баланс. Применение гемодиализа при острой почечной недостаточности оказывается благоприятным для развития репаративных, регенераторных процессов в почках при некронефрозе, чем, видимо, и объясняется высокая эффективность этого лечебного метода.

Исход нефроза

Written by Super Administrator

Friday, 26 November 2010 17:59 - Last Updated Thursday, 26 July 2012 20:52

Прочитать еще:

- 1) [Значение отека для организма](#)

- 2) [Нарушения минерального обмена](#)

- 3) [Выпадение волос](#)