

**Нефросклероз** — уплотнение и сморщивание почек вследствие разрастания соединительной ткани. Поверхность почек при этом становится неровной, крупно- или мелкобугристой (нефроцирроз).

**Этиология** нефросклероза разнообразна. При гипертонической болезни сосудистые нарушения приводят к появлению артериолосклеротического нефросклероза (нефроцирроза) или первичного сморщивания почек, при атеросклерозе имеет место атеросклеротический нефроцирроз. Уплотнение и сморщивание почек могут появиться не только первично из-за закупорки почечных артерий, но и вторично в исходе воспалительных и [некробиотических патологий](#) клубочков, канальцев и паренхимы (вторичное сморщивание почек).

Наиболее часто вторичное сморщивание почек случаются из-за **хронического гломерулонефрита**

Реже к вторичному сморщиванию почек приводят пиелонефрит (пиелонефритическое сморщивание почек или пиелонефритически сморщенные почки), амилоидный нефроз (амилоидное сморщивание почек или амилоидно-сморщенные почки), почечнокаменная болезнь, туберкулез почек, диабетический гломерулосклероз, инфаркты почек и др.

Дифференциальный диагноз нефросклерозов **различной природы** достаточно труден, особенно между первичным и вторичным (нефритическим) сморщиванием почек. Наличие гломерулита в разной стадии его развития, молодой возраст, скарлатина, ангина, охлаждение в анамнезе решают вопрос в пользу вторичного (нефритического) сморщивания. Нефросклероз (нефроцирроз) любой этиологии ведет к развитию азотемической уремии.

---

Прочитать еще:

- 1) [Инфаркт в сердце](#)
- 2) [Ультрамикроскопия гипертрофии](#)
- 3) [Механизм склероза](#)