

В зависимости от размеров отщепившегося бластомера могут возникать **три группы тератом**.

а) Гистиоидные тератомы построены из одной ткани, например из эпидермиса.

Они имеют вид кист, выстланных зрелым эпидермисом и выполненных роговыми массами или аморфным детритом, содержащим жир. Эти образования называют эпидермальными (эпидермоидными) кистами, или эпидермоидами.

б) Органоидные тератомы состоят из нескольких тканей. Они представляют собой кистевидное образование, выстланное эпидермисом, а полость его заполнена жировым детритом и волосами. Эти образования называют дермоидными кистами, или дермоидами.

в) Организмоидные тератомы построены из разных зрелых клеток, входящих в состав целого организма.

Они состоят из ряда полостей, сходных с дермоидом. Тератомы растут вместе со своим хозяином, но их рост идет главным образом за счет увеличения полостей, которые заполняются продуктами секреции дериватов эпидермиса. Все эти виды нарушений эмбрионального развития могут быть источником истинных опухолей. Тератомы часто встречаются в копчиково-крестцовой области, средостении, легких, половых железах, эпифизе. Отличить их от истинных опухолей не всегда легко.

Прочитать еще:

- 1) [Коррекция минеральных нарушений](#)
- 2) [Уремия](#)
- 3) [Установление этиологического фактора при пневмонии](#)