

Опухоли с характерными для них признаками встречаются у всех животных, но локализация их может быть иной, чем у человека. Опухоли у животных возникают как спонтанно, так и при воздействии различных бластомогенных веществ (индуцированные опухоли).

Спонтанные опухоли особенно подробно изучены у лабораторных животных. Так, спонтанные опухоли легких описаны у мышей, крыс, кроликов, собак. Опухоли желудочно-кишечного тракта у тех же животных встречаются сравнительно редко, а у морских свинок до сих пор не описаны. На 142 000 вскрытий мышей опухоли желудка обнаружены лишь у 14. Однако в последнее время удалось получить штаммы мышей, у которых [спонтанные опухоли](#) желудка и кишок наблюдаются часто. У крыс опухоли желудка не встречаются. Вообще опухоли желудочно-кишечного тракта наблюдаются **главным образом** у человека, а у животных относятся к сравнительно редким. Опухоли печени и почек у животных также встречаются редко. Опухоли мужских половых органов у самцов кроликов и морских свинок неизвестны. У мышей бывают опухоли яичек.

Опухоли яичника описаны у обезьян, у которых опухоли встречаются **значительно реже**, чем у человека. Опухоли матки описаны у крольчих, морских свинок, мышей, собак. В молочных железах особенно часто обнаруживаются опухоли у мышей. У многих животных встречаются опухолевые разрастания кроветворной ткани, клеток ретикуло-эндотелиальной системы.



Прочитать еще:

1) [Капсула нефрона при воспалении](#)

2) [Рахит](#)

3) [Воспаление и иммунитет](#)