

Молочная железа

Молочная железа является источником разнообразных опухолей, как мезенхимальных, так и эпителиальных. Характерными для этого органа опухолями являются следующие. Фиброаденома периканаликулярная состоит из трубчатых каналов, выстланных кубическим эпителием и окруженных слоями новообразованной соединительной ткани.

Фиброаденома интраканаликулярная образует впячивания соединительнотканых ростков, покрытых эпителием, в просвет трубчатых каналов. Последние приобретают причудливые очертания.

В строении той и другой фиброаденомы отмечается накопление кислых мукополисахаридов, особенно в период роста опухолей, что совпадает с дисгормональными нарушениями. Некоторые исследователи относят [фиброаденомы](#) молочных желез не к истинным опухолям, а к узловатым дисгормональным гиперплазиям. Злокачественные опухоли молочной железы относятся главным образом к раку.

Матка

В матке довольно часто развиваются различные опухоли. Помимо опухолей миогенного (миомы) и эпителиального (различные формы рака) происхождения, в матке встречаются характерные для нее опухоли.

Доброкачественные опухоли

Аденомиома характеризуется строением миомы, но с включением в нее железистых образований. Вероятно, слизистые железы попадают сюда в порядке эмбриональных смещений. При росте аденомиомы эпителиальные элементы могут не получить дальнейшего развития.

Деструирующий пузырьный занос представляет собой своеобразное изменение [хориона](#) (ворсинчатой оболочки) плодного яйца, в котором плод остановился в развитии или даже погиб. Ворсины увеличиваются в объеме, подвергаются слизистому превращению, а покрывающий их эпителий размножается, причем синцитиальные клетки внедряются в стенку матки.

Ворсины макроскопически выглядят в виде гроздьев винограда. Возникновение такого рода изменений хориона связывают с гормональными влияниями.



Прочитать еще:

1) [Атеросклероз венечных артерий](#)

2) [Ретикулез](#)

3) [Данные исследований](#) (гипертония)