Арренобластома — односторонняя опухоль круглой формы, на разрезе с желтоватым
оттенком; может достигать крупных размеров. Иногда отмечается дольчатое строение
Гормональное влияние опухоли проявляется в маскулинизации женского организма.

Малигнизация наблюдается редко.

Опухоль Бреннера — доброкачественная редкая опухоль, состоящая из ткани типа фибромы, среди элементов которой расположены эпителиальные включения в виде тяжей, островков и кист. По вопросу об источниках происхождения клеток опухоли Бреннера нет единого мнения. Предполагается наличие нескольких источников возникновения опухоли, а именно трубного эпителия, пароофорона и остатков вольфова протока. Гистологическое строение опухоли отличается большим разнообразием. Фиброзный компонент напоминает текому, а эпителиальный компонент выражен по-разному. Иногда это очень мелкие очажки, в других случаях — крупные, с образованием кист, выстланных однослойным или многослойным эпителием. Возможны вторичные дистрофические изменения в виде некроза и обызвествления. По внешнему виду опухоль Бреннера похожа на фиброму, очень плотная, при наличии большого числа кист на разрезе имеет губчатый вид. Опухоль односторонняя, встречается в возрасте старше 20 лет. Гормональные расстройства выражены слабо. Малигнизация наблюдается редко.

Прочитать еще:

٨	_	_	_		_	K	_	_	_	_	_	M	_
м	μ	μ	C	п	u	u	,,	а	C		u	M	а

<b>4</b> \	Пототочно	гипертонической болезни
1)	татогенез	типеотонической оолезни

2) Исходы кровотечения

3) Периферический рак легкого