

Кистаденокардиома серозная или псевдомуцинозная — одна из частых форм рака яичника. В раковой опухоли крайне затруднительно выяснить, из какого типа клеток она произошла.

Гистологическое строение в серозных кистаденокарциномах разнообразное. Однако преобладающим является наличие сосочковых выростов, покрытых анаплазированным эпителием (сосочковый рак). Часто возникают множественные участки солидного (трабекулярного) или аденоматозного строения. В разных локализациях одной и той же опухоли могут быть неоднородные [эпителиальные элементы](#). Опухолевые клетки, помимо эндофитного роста, идут по поверхности кист, сдавливая поверхностный эпителий или подрастая под него. Не исключается также имплантационный и инфильтративно-деструктивный рост с распространением раковых клеток на поверхность кисты и по брюшине.

В раке, возникающем из **псевдомуцинозных кист**, преобладают железистоподобные полости, выстланные пролиферирующим атипичным призматическим эпителием (кистаденокардиома). Раковые клетки располагаются также мелкими группами или тяжами и имеют разную форму. Строма в раковой опухоли яичника выражена различно. Данная форма является злокачественной и поэтому метастазирует гематогенным путем.

Прочитать еще:

- 1) [Специфическое воспаление](#)

- 2) [Этапы специфического воспаления при туберкулезе](#)

- 3) [Трупное разложение](#)