Доброкачественные опухоли

Аденома тубулярная (простая) располагается в корковом слое, часто имеет множественный характер.

Бывает величиной с лесной орех. Возникает из канальцевого эпителия, который, разрастаясь, образует полости, иногда кистозно расширенные. Эпителий кист может разрастаться в виде сосочков. В этом случае опухоль обозначают папиллярной кистаденомой. Она склонна к малигнизации.

Злокачественные опухоли

Эмбриональная нефрома, аденосаркома, опухоль Вильмса — смешанная опухоль почки, имеет очень пестрое строение. Состоит из саркоматозной ткани, среди элементов которой заключены железистые образования и отдельные волокна поперечнополосатой мускулатуры. Опухоль встречается главным образом у детей и достигает больших размеров. Гипернефроидный рак , рак из светлых клеток — часто встречающаяся злокачественная опухоль почек, возникающая из клеток эпителия извитых канальцев. Опухоль располагается чаще в верхнем полюсе почки, обычно инкапсулирована, на разрезе имеет пестрый вид. Растет быстро и прорастает лоханку, вены, быстро дает метастазы в легкие и лимфатические узлы. Гистологически состоит из крупных клеток со светлой цитоплазмой, содержащей липиды и гликоген. Строма выражена слабо.

Прочитать еще:

1) Проявления гиперальдостеронизма

2) Инфаркты головного мозга и легких

3) Лимфостаз