

Полиморфноклеточная саркома построена из разного рода клеток — крупных и мелких, круглых и овальных. Это очень злокачественная и быстрорастущая опухоль.

Овальноклеточная и веретенкоклеточная саркома отличаются формой клеток, принимающих уже вытянутую форму и напоминающих эпителиоидные клетки и фибробласты. Клетки образуют пучки, идущие в разных направлениях. В строении опухоли, помимо сосудов, появляются прослойки соединительной ткани.

Фибросаркома — наиболее дифференцированный тип саркомы. Построена из клеток типа фибробластов со значительными прослойками коллагеновых волокон. Растет медленно. Ксантосаркома может быть построена из клеток соединительной ткани разной зрелости, цитоплазма которых переполнена липидами.

Липосаркома — сравнительно редкая опухоль, характеризующаяся быстрым ростом. Метастазы дает редко. Поверхность разреза напоминает сало. Гистологически построена из индифферентных [соединительнотканых клеток](#) разных размеров и формы с капельками жира в их цитоплазме. Местами в клетках видны крупные капли жира.

Злокачественная гибернома построена из весьма полиморфного вида клеток, содержащих жир. Характерно появление крупных клеток с пенистой протоплазмой и пикнотичным ядром («тутовые клетки»).

Миксосаркома — очень редкая опухоль. Построена из недифференцированных клеток, связанных друг с другом отростками. На разрезе опухоль напоминает слизистую ткань.

Виды сарком

Written by Super Administrator

Monday, 22 November 2010 14:26 - Last Updated Friday, 27 July 2012 09:26

Прочитать еще:

- 1) [Гранулезоклеточная опухоль](#)
- 2) [Воспаление при сифилисе](#)
- 3) [Этиологические факторы и клиника при пневмонии](#)