

Гемангиома артериальная имеет ветвистый характер, т.е. распространяется на значительное протяжение. Состоит из ветвящихся и атипично построенных сосудов артериального типа (гроздевидная гемангиома).

Гломусангиома (опухоль Барре — Массона) развивается из артерио-венозных анастомозов, которых особенно много в коже ногтевых фаланг пальцев. Здесь чаще всего и встречается гломусангиома. Она состоит из переплетения тонко- или [толстостенных сосудов](#), окруженных муфтами из эпителиоидных клеток, которые входят в состав артерио-венозных анастомозов. В опухоли большое количество нервов; как правило, болезненна.

Гемангиоперицитома — сосудистая опухоль, в которой пролиферируют главным образом перициты — клетки, расположенные по наружной оболочке мелких сосудов. Эти клетки, имеющие овальную или вытянутую форму, образуют муфты вокруг щелевидных сосудов, в которых перициты расположены несколькими рядами

Ангиоретикулома —своеобразная сосудистая встречается в центральной нервной системе.

Множественная ангиоретикулома — болезнь **Линдау**.

Лимфангиома развивается из лимфатических сосудов, разрастающихся в разных направлениях и образующих узел или диффузное утолщение органа (в языке — макроглоссия, в губе — макрохеилия). На разрезе опухоль состоит из ряда разной величины полостей, наполненных лимфой. Нередко лимфангиомы возникают из неправильно сформированных лимфатических сосудов. Они наблюдаются на коже лица и шеи, в брыжейке, забрюшинной клетчатке.

Прочитать еще:

1) [Пароксизмальная форма феохромоцитомы](#)

2) [Опухоли яичка](#)

3) [Воспалительные разрастания эпителия](#)