

Гемангиосаркома — злокачественная опухоль сосудистого происхождения, в которой преобладают или эндотелиальные, или перичеситарные клетки.

В первом случае опухоль называют гемангиоэндотелиомой, во втором — злокачественной гемангиоперичеситомой (перителиомой). Для гемангиосаркомы характерен **клеточный** и **тканевый** атипизм, инфильтрирующий рост и метастазирование. Опухоли наблюдаются как у детей, так и у взрослых.

Геморрагическая саркома Капоши названа по имени венгерского патолога, впервые описавшего эту опухоль. Она имеет иногда множественный характер и появляется на коже, слизистых оболочках и во внутренних органах. Макроскопически опухоль представляется в виде узлов разной плотности, на разрезе с обширными участками [кро](#)
[воизлияний](#)

. Микроскопически опухоль построена из тонкостенных анастомозирующих капилляров, между которыми в большом числе размножаются вытянутой формы клетки, напоминающие фибросаркому.

Лимфангиосаркома (лимфангиоэндотелиома) — редкая злокачественная опухоль, для которой характерен атипичный рост эндотелия вдоль лимфатических сосудов. Это вызывает лимфатический отек ткани или органа, который скрывает подлинные размеры опухоли.

Гемангиосаркома

Written by Super Administrator

Monday, 22 November 2010 14:30 - Last Updated Friday, 27 July 2012 09:23

Прочитать еще:

- 1) [Гематогенный туберкулез с преимущественно внелегочными поражениями](#)

- 2) [Эндемический зоб](#)

- 3) [Течение болезни](#) (цирроз печени)