

Гемангиосаркома — злокачественная опухоль сосудистого происхождения, в которой преобладают или эндотелиальные, или перицитарные клетки.

В первом случае опухоль называют гемангиоэндотелиомой, во втором — злокачественной гемангиоперицитомой (перителиомой). Для гемангиосаркомы характерен **клеточный** и **тканевый** атипизм, инфильтрирующий рост и метастазирование. Опухоли наблюдаются как у детей, так и у взрослых.

Геморрагическая саркома Капоши названа по имени венгерского патолога, впервые описавшего эту опухоль. Она имеет иногда множественный характер и появляется на коже, слизистых оболочках и во внутренних органах. Макроскопически опухоль представляется в виде узлов разной плотности, на разрезе с обширными участками [кро](#)
[воизлияний](#)

. Микроскопически опухоль построена из тонкостенных анастомозирующих капилляров, между которыми в большом числе размножаются вытянутой формы клетки, напоминающие фибросаркому.

Лимфангиосаркома (лимфангиоэндотелиома) — редкая злокачественная опухоль, для которой характерен атипичный рост эндотелия вдоль лимфатических сосудов. Это вызывает лимфатический отек ткани или органа, который скрывает подлинные размеры опухоли.

Прочитать еще:

- 1) [Гематогенный туберкулез с преимущественно внелегочными поражениями](#)
- 2) [Эндемический зоб](#)
- 3) [Течение болезни](#) (цирроз печени)