

Рабдомиома — опухоль из поперечнополосатой мускулатуры, встречающаяся редко. Значительная часть рабдомиом возникает на почве порочного формирования ткани и часто комбинируется с другими пороками развития.

Это касается прежде всего рабдомиом миокарда, сочетающихся обычно с нарушением развития головного мозга (туберозный склероз). Рабдомиобластома, миома из миобластов, гранулярно-клеточная миобластома (опухоль Абрикосова) построена из миобластов. Протоплазма миобластов зернистая, клетки крупные. [Опухоль доброкачественная](#),

хотя состоит из молодых клеток и обладает инфильтрирующим ростом. Встречается в толще языка и других поперечнополосатых мышц. Вопрос о гистогенезе этой опухоли окончательно не решен. Некоторые думают об ее соединительнотканном или нервном происхождении.

Злокачественные опухоли

Лейомиосаркома отличается от лейомиомы полиморфизмом клеток, а также выраженным клеточным и тканевым атипизмом. Много клеток с типичными и атипичными митозами. Иногда атипизм достигает такой степени, что установить гистогенез опухоли невозможно. Рабдомиосаркома напоминает по строению полиморфноклеточную саркому. Только выявление отдельных клеток со слабо выраженной поперечной исчерченностью позволяет высказать предположение о гистогенезе опухоли. Опухоль очень злокачественная, растет быстро и дает метастазы.

Прочитать еще:

Рабдомиома и саркома

Written by Super Administrator

Monday, 22 November 2010 14:32 - Last Updated Friday, 27 July 2012 09:21

- 1) [Внешний вид органа при дистрофии](#)

- 2) [Продуктивное воспаление](#)

- 3) [Морфология абдоминальной ишемии](#)