

Рост и распространение рака желудка осуществляются следующим образом.

Раковые клетки распространяются главным образом по лимфатическим путям, прорастают стенку желудка и переходят на **соседние органы**— пищевод, поджелудочную железу, печень и т. д. Рак, расположенный в области дна, растет по направлению к воротам селезенки. Большой сальник при прорастании раковой опухоли сморщивается, укорачивается и подтягивается вверх. При сдавлении опухолью желчного протока и воротной вены развиваются желтуха и асцит.

Метастазы рака желудка очень часты. Однако, по мнению некоторых авторов, у 14% больных рак желудка длительное время не метастазирует и в таких случаях [тотальная резекция желудка](#) может оказаться весьма эффективной. Метастазирование происходит по лимфатическим путям, брюшине и кровеносным сосудам.

Лимфогенное метастазирование

наиболее важно и играет основную роль в распространении опухоли. А. В. Мельников выделяет четыре основных лимфатических коллектора, собирающих лимфу из различных отделов желудка и являющихся первыми путями метастазирования рака желудка. Первый коллектор идет от задней и нижней стенок пилорического отдела и впадает в лимфатические узлы, расположенные вдоль привратника в клетчатке позади пилородуоденальной связки, а дальше — в лимфатические узлы брыжейки и парааортальные узлы.

Прочитать еще:

Written by Super Administrator

1) Гонорея

2) Проявления поражения вестибулярного анализатора

3) Аденокарцинома