

Макроскопическая картина рака легкого следующая. Рак легкого, исходящий из слизистой оболочки бронха, может иметь вид небольшого узелка — полипа, закрывающего просвет бронха, когда преобладает экзофитный (в просвет) рост.

Иногда раковые клетки образуют узел вокруг бронха и, врастая в его стенку, распространяются на прилежащую легочную ткань (эндофитный рост, в ткань органа). Просвет бронха в таких случаях долгое время **остается проходимым**. Иногда раковая опухоль распространяется по перибронхиальным и пери-васкулярным лимфатическим сосудам и приобретает как бы разветвленный характер, распространяясь от узла, расположенного в стенке крупных бронхов. Встречаются также формы рака, клетки которого растут диффузно на протяжении бронха как эндобронхиально, так и [перибронхиально](#)

. В связи с этими макроскопическими особенностями опухоли в настоящее время принято выделять несколько форм легкого. Классификация рака легкого учитывает локализацию, форму и характер роста, микроскопическую картину,

осложнения

.

Эта классификация является клинко-анатомической, так как в известной мере удовлетворяет запросы клиники. Выяснение локализации рака, его гистологической картины, характера роста, осложнений имеет значение для определения методов лечения, объема хирургического вмешательства и прогноза.

Прочитать еще:

Monday, 22 November 2010 15:11 - Last Updated Thursday, 26 July 2012 22:07

- 2 / 2