

Интрадуктальный (внутрипротоковый) рак составляет 4,2% раковых опухолей молочной железы.

Эта форма рака характеризуется разрастанием эпителия протоков, и опухолевые массы распространяются внутри протока. Опухоли на разрезе напоминают распил свежей доски с пересеченными многочисленными канальцами (протоки), из которых при надавливании выдавливаются рыхлые опухолевые массы в виде пробочек и цилиндров. Этот рак обозначается еще как угревидный рак.

Рак соска и соскового поля (син. педжетова болезнь соска), встречающийся в 0,5—2% случаев рака молочной железы, развивается в соске и его окружности. Раковые клетки разрастаются как по поверхности, так и в глубину, по выводным протокам.

Гистологически опухоль имеет строение плоскоклеточного рака и состоит из больших клеток со **светлой протоплазмой** и **полиморфными ядрами**. Рост и распространение [рака молочной железы](#)

обусловлены вращением мягких тканей железы; далее клетки проходят в межтканевые щели, лимфатические и кровеносные сосуды. Клетки опухоли внедряются в фасциальные прослойки и прорастают в соседние мышцы.

Метастазы бывают локальными и отдаленными. Местные метастазы лимфогенные появляются в регионарных лимфатических узлах, сперва в передних грудных, потом в подключичных, парастеральных, надключичных, подмышечных.

Интрадуктальный рак

Written by Super Administrator

Monday, 22 November 2010 15:16 - Last Updated Thursday, 26 July 2012 21:54

Прочитать еще:

- 1) [Стаз крови](#)

- 2) [Экспериментальные данные](#) (Склеротические процессы)

- 3) [Ретикулярные клетки](#)