

Рак яичка составляет 0,67% всех злокачественных опухолей у мужчин. Он отличается большим разнообразием как по происхождению, так и по морфологической картине. Наиболее часто встречается семинома. Кроме того, рак яичка возникает из тератоидных опухолей.

Рак яичка дает распространенные лимфогенные и гематогенные метастазы. В редких случаях из тератоидных опухолей яичка развивается опухоль, сходная по строению с хорионэпителиомой. Рак почек составляет 1—2% по отношению к злокачественным опухолям всех органов. Обычно он наблюдается в возрасте от 40 до 60 лет, преимущественно у мужчин. В этиологии рака почек и других опухолей этого органа большое значение имеют дизонтогенетические процессы: опухоли возникают из отщепившихся зародышевых зачатков. Различают две разновидности рака почек: гипернефроидный рак почек и обычный рак. Обычный рак развивается из тубулярного эпителия, имеет вид узлов разной величины.

Микроскопически обычный рак имеет строение аденокарциномы, мозговидного рака или скirrа. Рак лоханок, мочеточников и мочевого пузыря носит характер сосочковых разрастаний на тонкой ножке или на широком основании. Такая опухоль растет обычно экзофитно и постепенно заполняет просвет органа. Сосочки могут распадаться, отрываться, что сопровождается гематурией, а в опухоли возникают вторичные воспалительные изменения. Гистологически это обычно переходноклеточный рак. В этиологии рака мочевого пузыря имеют значение хронические воспалительные процессы, вызываемые паразитом шистосомоза. Эта болезнь носит название «бильгарциоза» по имени автора, ее описавшего. Встречается в некоторых странах Африки. Рак мочевого пузыря может возникать у людей, длительное время подвергающихся воздействию некоторых химических веществ, например производных анилина.

Прочитать еще:

1) [Экссудативные процессы при гастрите](#)

2) [Воспаления толстого кишечника](#)

3) [Портальный цирроз печени](#)