

Этиология любых видов анемий разнообразна, и среди их причин играют роль факторы как эндогенные, так и экзогенные. Эндогенные гипо- и апластические анемии встречаются сравнительно редко; к ним относятся семейная апластическая анемия и апластическая анемия типа Эрлиха.

Последняя имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей анемией, сопровождается кровоточивостью, иногда присоединением **некротических процессов** в зеве и

сепсиса. В крови наблюдается уменьшение числа всех форменных элементов крови без признаков регенерации. Основные изменения в крови касаются не качественных ее нарушений, а главным образом количественного сокращения кроветворной ткани, и выражаются в общем уменьшении

эритроцитной массы

. В этом и заключается особенность апластической анемии: поражается

эритробластический росток

крови, эритрон, т. е. совокупность эритробластических элементов костного мозга и эритроцитов периферической крови. Наиболее характерные изменения обнаруживаются в костном мозге плоских и трубчатых костей. Всяду костный мозг желтый, жировой. При

[гистологическом исследовании](#)

среди массы жира в костном мозге находят единичные кроветворные клетки. В случаях тотального истощения костного мозга и замещения его жиром говорят о панмиелофтизе — «чахотке» костного мозга.

Прочитать еще:

Этиология

Written by Super Administrator

Tuesday, 23 November 2010 19:05 - Last Updated Sunday, 29 July 2012 12:23

- 1) Клиника Эмфиземы
- 2) Зев и глотка
- 3) Рост опухоли желудка