

Порок сердца (vitium cordis) представляет собой заболевание, возникающее после перенесенного клапанного эндокардита, на почве атероскле-ротических изменений клапанов или же в результате внутриутробного нарушения развития сердца.

В основе порока сердца лежат неправильности в строении сердца, главным образом его клапанов, приводящие к значительным нарушениям функции. Существует много разновидностей порока сердца. В настоящее время их разделяют на две большие группы: приобретенные и врожденные пороки.

Приобретенные пороки сердца возникают после клапанного, реже подклапанного парietального эндокардита, а также как осложнение атеросклероза, если процесс переходит с аорты на ее клапаны.

Этиология приобретенных пороков сердца разнообразна. Чаще всего они развиваются после перенесенного ревматического эндокардита (до 94%), небольшое число пороков сердца имеет [атеросклеротическое происхождение](#) (3—4%) и редко (2—3%) встречаются пороки сердца после перенесенных инфекций (скарлатина, сепсис, бруцеллез, сифилис) или травмы. Приобретенные пороки сердца — это обычно медленно возникающие поражения сердца, однако в редких случаях порок сердца может возникнуть остро. Это наблюдается при таких заболеваниях, как острый язвенный эндокардит (например, при сепсисе), когда происходит быстрое разрушение створок клапанов, отрыв хорд и возникает острая недостаточность клапанов.

Прочитать еще:

- 1) [Периферический рак легкого](#)
- 2) [Патологическая анатомия эклампсии](#)
- 3) [Поражение мозгового ствола](#)