

При длительном течении заболеваний соотношения белковых фракций крови нарушаются в такой степени, что говорят о диспротеинозе как характерном клинико-анатомическом признаке этих болезней.

Очень важным признаком, объединяющим коллагеновые болезни, является склонность к рецидивирующему течению. Это свидетельствует о том, что [патологический процесс](#) по существу не прекращается, а только несколько затихает, а затем снова обостряется. Таким образом, для коллагеновых болезней характерно как бы

непрерывное

и

прогрессирующее

течение, и в этом одна из трудных сторон борьбы с описываемой группой заболеваний. В пользу такого предположения говорит также факт сочетания при коллагеновых болезнях как свежих, так и более старых процессов

дезорганизации соединительной ткани

, что придает морфологической, а также клинической картине заболеваний весьма полиморфный характер.

Очень важно отметить, что одним из ранних клинических предвестников каждой из коллагеновых болезней является воспалительное поражение суставов — артралгия, выраженная в разной степени.

Объединяющим все коллагеновые болезни признаком может служить и факт наличия при них висцеральных поражений, развивающихся вне зоны преимущественной локализации патологического процесса.

Патогенез

Written by Super Administrator

Wednesday, 24 November 2010 14:50 - Last Updated Monday, 30 July 2012 12:23

Прочитать еще:

- 1) [Патология сосудов головного мозга](#)

- 2) [Формирование ревматических гранул](#)

- 3) [Терапия](#) артериальной гипертензии