

Долгое время существовало мнение о том, что склеродермия относится к области дерматологии. В настоящее время установлено, что это системное и прогрессирующее заболевание соединительной ткани всего организма.

Клинически было замечено, что иногда склеродермия начинается не с кожных, а с висцеральных поражений. Например, у больных, прежде чем разовьются изменения в коже, **появляются признаки расстройств** сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, легких, почек и т. д. Дальнейшими морфологическими исследованиями выявлены висцеральные поражения при склеродермии. Сердце при склеродермии также поражается. Отмечается развитие в эндокарде и в межленточной ткани сердца мукоидного набухания и возникновение обширных полей

[фиброзной ткани](#)

. Образование ее происходит без какой-либо клеточной реакции и при отсутствии склеротических изменений со стороны венечных артерий.

Склероз миокарда и эндокарда возникает особым образом, путем фиброзного превращения предсуществующей стромы миокарда. Эти изменения имеют, однако, большое клиническое значение и могут повести к нарушению сердечной деятельности («**склеродермическое сердце**

»). В очень редких случаях на почве склероза клапанного эндокарда возникает склеродермический порок сердца.

Прочитать еще:

1) [Иннервация мочевого пузыря](#)

2) [Гнозия, Праксия](#)

3) [Локтевой и срединный нерв](#)