

Атеросклероз - главная причина сосудистых поражений жизненно важных органов: сердца, мозга, аорты, почек, а также органов брюшной полости. Благодаря большим успехам в области изучения биохимии липидов, генетики, эпидемиологии значительно расширились современные представления о патогенезе атеросклероза, существенно

возросли диагностические возможности и появились новые методы эффективного лечения ишемической болезни сердца (ИБС), цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и ишемических поражений почек. В то же время, несмотря на чрезвычайную распространенность атеросклеротического процесса, вопросы **ишемических поражений** органов брюшной полости изучены и освещены в литературе недостаточно. Практические врачи поверхностно ознакомлены с возможностями ранней диагностики и лечения данной патологии как на амбулаторном этапе, так и в стационарах.

Большинство работ, посвященных **стенозирующему атеросклерозу** висцеральных ветвей брюшной аорты, освещает вопросы острой абдоминальной ишемии (ОАИ) и мало уделяется внимания хроническим ишемическим поражениям органов пищеварения. Необходимо отметить, что прижизненно диагноз

[брюшной жабы](#)

устанавливается лишь в 35 — 45% случаях, в то время как в 50 — 57% хроническая абдоминальная ишемия (ХАИ) приводит к развитию острых расстройств чревно-мезентериального кровообращения. При развитии ОАИ консервативная терапия уже неэффективна и наблюдается большой процент летальных исходов при оперативных вмешательствах.

Прочитать еще:

- 1) [Венозная гиперемия](#)
- 2) [Насильственная смерть](#)
- 3) [Клетки гистиогенного происхождения и их роль при воспалении](#)