

Слизистая оболочка зева и глотки богата лимфоидной тканью, расположенной в ней как диффузно, так и в виде узелковых скоплений.

Крупные лимфоидные скопления образуют **миндалины**. В слизистой оболочке свода носоглотки находится третья миндалина (глоточная); у корня языка примыкает к надгортаннику четвертая (язычная) миндалина; по сторонам от входа в полость зева симметрично расположены первая и вторая небные миндалины.

В слизистой оболочке зева и глотки возникают воспалительные процессы разного характера и этиологии. Особое значение имеет воспаление слизистой оболочки зева в сочетании с [воспалением миндалин](#) (чаще небных), которое обозначают как ангина или тонзиллит. По клинко-анатомическому значению ангины подразделяются на

первичные

и

вторичные

,

острые

и

хронические

. Острые ангины по характеру воспаления делятся на следующие виды: катаральная, лакунарная, фибринозная, фолликулярная, гнойная (флегмонозная), некротическая, геморрагическая, гангренозная.

Катаральная ангина (**тонзиллит**) — острое воспаление слизистой оболочки небных миндалин и небных дужек. Слизистая оболочка резко полнокровная или синюшная, тусклая, покрыта слизью. Иногда экссудат приподнимает эпителий, и образуются мелкие пузырьки с мутным содержимым.

[О](#)

[радиотехнике](#)

вся полезная информация об электронике современного времени.

Прочитать еще:

- 1) [Классификация нарушений кровообращения](#)

- 2) [Тромбообразование](#)

- 3) [Тканевая и бактериальная эмболия](#)