

В околоушных и подчелюстных слюнных железах наблюдаются воспалительные, дистрофические и опухолевые процессы. Воспаление слюнных желез (**сиалоадениты**) и их протоков (

### **сиалодохиты**

) возникает гематогенным, лимфогенным, интрадуктальным путем, а также при переходе воспалительного процесса с соседних тканей.

Наиболее часто встречаются гнойные сиалоадениты и сиалодохиты. Воспаление околоушных желез называется паротитом. Сиалоадениты и паротиты возникают в большинстве случаев вторично, за исключением [эпидемического паротита](#) — самостоятельной инфекционной болезни с преимущественным поражением околоушных желез. Желудок обладает секреторной, элиминативной и резорбционной функциями, интенсивность которых изменяется при различных патогенных воздействиях на слизистую оболочку желудка и на организм в целом. В результате этих воздействий в слизистой оболочке желудка развивается ряд изменений, приводящих к нарушению функций и возникновению различных болезней.

Воспалительные заболевания желудка — гастриты — занимают большое место в клинике внутренних болезней.

**Этиология** гастритов **разнообразная**. Важную роль в возникновении гастритов играют различные раздражающие вещества — алкоголь, пряности, медикаменты, химические вещества и т. д. Большое значение имеет также плохое прожевывание пищи. Микроорганизмы в развитии гастритов значат также много, как и грубая пища. В последнее время вопрос о роли инфекции в возникновении гастритов уже не подвергается сомнению, настолько этот вопрос изучен.

[Самые свежие политические новости россии](#) будут держать вас в курсе о последних событиях в стране. Особенно следует уделить внимание рубрике, посвященной здравоохранению.

### Прочитать еще:

- 1) [Липидогенные пигменты](#)
- 2) [Причины и механизмы развития ожирения](#)
- 3) [Продуктивное воспаление](#)