

Патогенез гастритов сводится в одних случаях к непосредственному воздействию раздражителей на слизистую оболочку (экзогенные гастриты), а в других — патогенный фактор действует опосредованно с участием нервных или гуморальных механизмов.

Значительная роль в возникновении гастритов при инфекционных болезнях принадлежит гематогенному заносу в стенку желудка бактерий и их токсинов, а также продуктов белкового обмена, образующихся при инфекциях (эндогенные гастриты).

Большое значение имеют нервнорефлекторные влияния, а также нарушения циркуляции крови и возникающий в связи с этим недостаток кислорода в тканях.

По течению гастриты разделяют на острый и хронический.

Патологическая анатомия острого гастрита складывается из макроскопических и микроскопических изменений. Макроскопически слизистая оболочка при гастрите набухшая, полнокровная, покрыта слизью. Складки выражены неодинаково; они или хорошо заметны, а при сокращении желудка даже четко выражены, или сглажены и атрофичны (особенно при [атоническом состоянии](#) и расширении желудка). Микроскопически при гастрите наблюдается сочетание альтеративных, экссудативных и пролиферативных процессов, сопровождающихся нарушением секретообразования и выделения в системе желудочных желез.

Патогенез гастритов

Written by Super Administrator

Friday, 26 November 2010 16:57 - Last Updated Thursday, 09 August 2012 13:52

Прочитать еще:

- 1) [Дефицит кальция](#)

- 2) [Изменения в клеточных структурах](#)

- 3) [Билирубин](#)