

Альтеративные процессы заключаются в дистрофических изменениях покровного эпителия и железистых трубок.

В покровном эпителии отмечается обеднение цитоплазмы клеток гранулами мукоидного секрета, появление в ней мелких вакуолей, перемещение ядра к центру клеток. По мере нарастания воспаления дистрофия клеток усиливается, часть покровных клеток гибнет и появляются поверхностные дефекты — воспалительные эрозии (так называемый эрозивный гастрит). Среди клеток железистых трубок наибольшие дистрофические изменения наблюдаются в **обкладочных клетках** (набухание, сморщивание, исчезновение гранул секрета, распад клеток). Главные клетки также подвергаются дистрофическим изменениям, но не погибают, а превращаются в клетки [индафферентного эпителия](#)

. Такие же изменения развиваются в

добавочных клетках

. Описанные изменения свидетельствуют о том, что при гастрите происходит угнетение секретобразования в системе желудочных желез.

При сдавлении устьев желез спущенным эпителием и лейкоцитами секрет в просвете желез задерживается и образуются ретенционные кисты. Усиленное выделение мукоидного секрета клетками покровного эпителия приводит к тому, что поверхность слизистой оболочки желудка покрывается мукоидным секретом.

Прочитать еще:

Friday, 26 November 2010 16:58 - Last Updated Sunday, 19 August 2012 13:30

-
- 2 / 2