

Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором наблюдается сочетание следующих пяти основных процессов: дистрофии печеночных клеток, их регенерации, диффузного разрастания соединительной ткани (склероз), перестройки структуры органа, деформации печени в связи с развитием склеротических процессов.

Название болезни происходит от греческого слова «kirros», что означает «янтарный», «рыжий». Это название предложил **Laenneck**.

Этиология цирроза печени разнообразна, поэтому понятие «цирроз печени» является в известной мере собирательным. Так, существует группа инфекционных циррозов печени; особенно часто они возникают после вирусной инфекции, вызывающей болезнь Боткина. В настоящее время установлено, что более чем в 75% случаев цирроз печени развивается после перенесенного боткинского вирусного гепатита. Кроме того, цирроз печени может возникнуть после перенесенной [токсической дистрофии печени](#), малярии, лейшманиоза, при воспалении желчных путей, паразитарных инвазиях. Значительное место занимают алиментарные, или обменные, циррозы, развивающиеся в связи с недостаточностью белков и главным образом липотропных факторов (холин, метионин). Большую роль в возникновении цирроза печени играет алкоголизм, нарушение жирового и белкового обмена, обмена меди, тиреотоксикоз. Такие циррозы носят название метаболических.

Прочитать еще:

- 1) [Патологическая анатомия перикардита](#)
- 2) [Работа почки при амилоидозе](#)
- 3) [COAC](#)