

Внутридольковая соединительная ткань образуется главным образом за счет спадения стромы долек в результате гибели клеток (коллапс дольки).

При этом аргирофильные и коллагеновые волокна размножаются, вследствие чего возникают поля склероза. Обычно регенерирующие печеночные клетки, образуя аденоматозные узелки, разрастаются в прослойках соединительной ткани, постепенно ее оттесняют и оказываются окруженными ею. Эта новообразованная соединительная ткань богата как **молодыми** (округлой формы), так и более **зрелыми** (вытянутой формы) клетками соединительной ткани. Не всякое развитие соединительной ткани в печени можно обозначать как цирроз. В печени могут наблюдаться

[разрастания соединительной ткани](#)

репаративного и реактивного характера после острого гепатита, вокруг паразитов (например,

эхинококка

), на месте гумм, туберкулезных бугорков.

Однако эти фиброзы не сопровождаются ни регенерацией, ни образованием аденом, ни тем более перестройкой печеночной ткани. Поэтому при такого рода очаговом или даже диффузном разрастании соединительной ткани говорят не о циррозе, а о фиброзе или склерозе печени. Клинически эти изменения диагностируются с трудом, так как функция печени при них не нарушается.

Прочитать еще:

- 1) [Клиника феохромоцитомы](#)
- 2) [Лечение гиперальдостеронизма](#)
- 3) [Опухоли меланинообразующей ткани](#)