Субдуральное кровоизлияние возникает при разрыве мелких сосудов мозжечкового намета или серповидного отростка твердой мозговой оболочки. Интрацеребральные и интравентрикулярные кровоизлияния относятся к наиболее тяжелым проявлениям родовой травмы.

При выживании ребенка возможны остаточные изменения с органическими поражениями центральной нервной системы. Кровоизлияния во внутренних органах могут быть следствием не только травмы, но и проявления геморрагического диатеза . Инфекционные болезни новорожденных описаны в разделе об инфекциях: это врожденный сифилис, цитомегалия, токсоплазмоз, пневмония, пупочный сепсис.

Гемолитическая болезнь новорожденных (эритробластоз) — тяжелое заболевание, опасное для жизни ребенка.

Причиной заболевания является несовместимость крови матери и плода по резус-фактору. У плода возникает гемолиз эритроцитов и развивается гемолитическая желтуха, которая сопровождается нарушением кроветворения . Это выражается гиперплазией эритробластической ткани. В костном мозгу и печени возникают очаги усиленного эритробластического кроветворения.

При вскрытии умерших новорожденных обращает на себя внимание желтуха, увеличенная селезенка и особенно выраженное диффузное прокрашивание билирубином подкорковых ядер серого вещества головного мозга и мозжечка, что обозначают как ядерную желтуху. Необходимо заметить, что у большей части новорожденных наблюдается так называемая физиологическая желтуха, возникающая при переходе новорожденного от внутриутробного существования к вне-утробному. Она быстро проходит. Нарушения внутриутробного развития касаются различных систем организма. Наибольшее практическое значение имеют врожденные пороки сердца.

Медицина лечит инсульты в детском возрасте.

Прочитать еще:

1) Диффузный гломерулонефрит

2) Морфогенез амилоидоза

3) Благоприятные исходы тромбообразования