

Болезнь Иценко — Кушинга возникает при появлении в передней доле гипофиза аденомы из базофильных клеток. Заболевание проявляется ожирением лица, туловища (верхний тип ожирения) и отсутствием накопления жира на бедрах.

На коже живота появляются борозды, сходные с теми, которые встречаются у беременных. Поражение гипофиза сочетается с гиперплазией коры надпочечника. В связи с изменениями в надпочечниках у больных наблюдается гипертония, гипертрихоз (усиленное оволосение) и гликозурия.

Несахарное мочеизнурение, (**diabetes insipidus**) — несахарный диабет — заболевание, возникающее при поражении задней доли гипофиза. Здесь могут развиваться опухоли, специфические и неспецифические склеротические процессы, например в связи с травмой и т. д. Одновременно с изменениями в задней доле постоянно встречаются такого же характера процессы и в межуточном мозге, тесно связанном с гипофизом. А вот [ЛУЧШИЕ СТОМАТОЛОГИ](#) вы можете найти на нашем сайте-партнере.

Поэтому возникающие в организме изменения имеют как гормональное, так и нервное происхождение и носят характер обменных нарушений. К этой группе болезней относится и несахарный диабет. При нем наблюдается резкое [понижение способности почек](#) к концентрации мочи, выделение обильных количеств мочи (**полиурия**), бедной солями, и повышенная жажда (полидипсия). Опухоли гипофиза развиваются из функционирующих клеток и потому являются гормонально-активными.

При росте они оказывают давление на межуточный мозг, в связи с чем наряду с гормональными возникают и обменные нарушения. В гипофизе наблюдаются аденомы и раковые опухоли из главных, эозинофильных и базофильных клеток, а также опухоли из остатков гипофизарного хода. Последние гормональной активностью не обладают, однако, сдавливая основание мозга и гипофиз, могут вызвать обменные нарушения.

Прочитать еще:

- 1) [Системный сепсис](#)
- 2) [Опухоли сосудистого происхождения](#)
- 3) [Паренхима опухоли](#)