

Болезнь Боткина (эпидемический гепатит) — инфекционное вирусное заболевание. Инфекционная природа, клиническая картина, контагиозность заболевания описаны известным русским терапевтом С. П. Боткиным в конце прошлого столетия. Болезнь названа его именем.

Этиология эпидемического гепатита была предметом многочисленных исследований. В последние годы установлена вирусная природа заболевания и описано несколько разновидностей этого вируса.

Патогенез эпидемического гепатита сложен. Источником инфекции и резервуаром вируса является человек; основной путь инфекции алиментарный. Но существует и парентеральный путь, когда вирус проникает в организм с переливаемой кровью, сывороткой и при других инъекционных манипуляциях («**шприцевой гепатит**»). Продолжительность болезни 5—6 недель, причем инкубационный период продолжается 3—4 недели. Вирус болезни Боткина обладает определенной гепатотропностью, так как

воспалительно-дистрофические изменения в печени преобладают в [общей картине заболевания](#)

. Эти изменения зависят от массивности инфекции, ее вирулентности, состояния защитных сил организма, аутоиммунных процессов. Предполагается, что аутоантигеном является денатурированный белок погибших печеночных клеток. Образующиеся по ходу болезни печеночные аутоантитела усиливают патогенное действие вируса. Большое значение для возникновения болезни имеют возраст больных, перенесенные болезни, эндокринные нарушения и т. д.



Прочитать еще:

- 1) [Патологическая анатомия перикардита](#)
- 2) [Советы врачу](#) (феохромоцитома)
- 3) [Запястные тонометры](#)