

Существует группа энцефалитов, которые вызываются вирусами. Сюда относятся японский энцефалит (комариный, энцефалит типа Б, летне-осенний) и клещевой (дальневосточный, весенне-летний эндемический).

Обе формы энцефалита представляют собой острые трансмиссивные вирусные заболевания, причем передатчиком первого являются определенного вида комары, а второго — иксодовые клещи. При [японском энцефалите](#) в веществе головного и спинного мозга отмечается гиперемия, пролиферация эндотелия сосудов мелкого и среднего калибра, фибриноидное набухание стенок, тромбоз, формирование вокруг сосудов гранулем, состоящих из

микроглиальных клеток

. При японском энцефалите в связи с выраженными сосудистыми изменениями — васкулитами — возникают множественные очажки размягчения. В нервных клетках вне этих очагов обнаруживаются дистрофические явления.

Важно отметить, что изменения при японском энцефалите носят весьма распространенный характер и поражаются все отделы головного и спинного мозга. При клещевом энцефалите возникает картина **менинго-энцефаломиелита**. В головном и спинном мозгу появляются воспалительные очаги с массивной гибелью нервных клеток; особенно интенсивно эти изменения выражены в спинном мозгу.

Однако при клещевом энцефалите в отличие от японского кора поражается слабее и, кроме того, в воспалительных инфильтратах отмечается значительная примесь лейкоцитов, чего не наблюдается при японском энцефалите. При обеих формах вирусного энцефалита во внутренних органах возникают дистрофические изменения.

Вирусные энцефалиты

Written by Super Administrator

Monday, 29 November 2010 10:06 - Last Updated Tuesday, 14 August 2012 14:59

Прочитать еще:

- 1) [Актиномикоз](#)
- 2) [Морфология легких](#)
- 3) [Морфология эхинококка](#)